

# OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA (OVA)

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

AVALIAR A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO

LATENTE (Até 1 ano)

CRIANÇA (>1ano)

ADULTO

TOSSE EFICAZ

Vigiar continuamente:  
- Até resolver a obstrução ou  
- Até apresentar tosse **INEFICAZ**

TOSSE INEFICAZ  
(PEÇA AJUDA)


CONSCIENTE

**Aplique 5 pancadas interescapulares:**

- Apoie o latente, de barriga para baixo, sobre o seu antebraço e aplique as pancadas com a base da sua mão, na parte superior das costas, entre as omoplatas. Se não desobstruir, aplique

**5 compressões torácicas:**

- Rode o latente de modo a que fique de barriga para cima, coloque dois dedos no meio do peito e aplique as compressões, deprimindo pelo menos 4 cm.



Mantenha estas manobras até resolver a obstrução ou até que a vítima fique inconsciente!

Se a vítima ficar inconsciente, peça ajuda, verifique a cavidade oral, aplique 5 ventilações e inicie SBV. Caso não tenha sido acionado 112, faça-o após 1 min de SBV.

TOSSE EFICAZ

Encorajar a criança a tossir e vigiar continuamente:  
- Até resolver a obstrução ou  
- Até apresentar tosse **INEFICAZ**

TOSSE INEFICAZ  
(PEÇA AJUDA)


CONSCIENTE

**Aplique 5 pancadas interescapulares:**

- Coloque-se à altura da criança e com a base da sua mão, na parte superior das costas, entre as omoplatas, aplique as pancadas. Se não desobstruir, aplique

**5 compressões abdominais:**

- Coloque uma mão em punho fechado acima do umbigo da criança e sobrepondo a outra mão, aplique as compressões para dentro e para cima.



Mantenha estas manobras até resolver a obstrução ou até que a vítima fique inconsciente!

Se a vítima ficar inconsciente, peça ajuda, verifique a cavidade oral, aplique 5 ventilações e inicie SBV. Caso não tenha sido acionado 112, faça-o após 1 min de SBV.

TOSSE EFICAZ

Encorajar a vítima a tossir e vigiar continuamente:  
- Até resolver a obstrução ou  
- Até apresentar tosse **INEFICAZ**

TOSSE INEFICAZ

CONSCIENTE

**Aplique 5 pancadas interescapulares:**

- Com a base da sua mão, na parte superior das costas, entre as omoplatas da vítima, aplique as pancadas. Se não desobstruir, aplique

**5 compressões abdominais:**  
- Coloque uma mão em punho fechado acima do umbigo da vítima e sobrepondo a outra mão, aplique as compressões para dentro e para cima.



Mantenha estas manobras até resolver a obstrução ou até que a vítima fique inconsciente!

Se a vítima ficar inconsciente, acione 112 e inicie SBV.

As suas mãos salvam vidas!